

¿Qué es Inyectarse?

"Inyectarse" es la práctica de inyectar silicona o sustancias similares en partes del cuerpo con una aguja o "bomba". Cuando se hace por fuera de instalaciones médicas, no hay manera de saber lo que se está inyectando.

Aunque se te diga que es silicona "de grado médico", es más probable que se trate de sustancias que se obtiene fácilmente como:

"Fix-a-Flat" o sellantes para llantas

Silicona de grado industrial

Sellante para baños

Cemento

Fibra de vidrio

Vaselina

Pegamento

¿Por qué las personas se hacen inyectar?

Sin acceso a servicios de salud de calidad y costeable, de opciones para cirugías seguras, combinadas con la presión social y una imagen pobre del propio cuerpo, muchas personas, hombres y mujeres, transgenerxs y no transgeneros/cisgénero, recurren a las calles o al "mercado negro" para conseguir el cuerpo que desean.

Hay opciones más seguras.

Para mayor información, consulta a unx médicx. Comunícate con BreakOUT! si deseas información sobre médicxs amigables con las personas trans en el área de Nueva Orleáns.

info@youthbreakout.org
(504) 252-9025

¿Por qué es peligroso el inyectarse?

- Quienes ofrecen el servicio de inyección generalmente no son médicxs ni tienen capacitación médica.
- Cuando se inyectan en el lugar equivocado, las sustancias pueden entrar al torrente sanguíneo y llegar a los pulmones..
- Tu cuerpo puede responder a la sustancia externa, entrar en shock tóxico y empezar a apagarse..
- Puedes atrapar una infección que rápidamente puede alcanzar a otras partes del cuerpo, causándote dolor o amputación de miembros .
- **Incluso años después de haber sido inyectadx**, la silicona puede desplazarse por el cuerpo ocasionando desfiguración .



Bre Hall en 2013. Bre estuvo en coma durante casi un mes antes de morir a causa de silicona que entró a sus pulmones.

Posibles riesgos:

- Deformidad permanente
- Infección
- Coágulos sanguíneos
- Amputación de miembros
- Muerte

¿Cómo reconocer las señales de una infección?

- Inflamación y dolor localizado
- Fiebre
- Moretones
- Piel caliente en el sitio de inyección
- Endurecimiento del área
- Dificultad para respirar

SI NOTAS ALGUNA DE ESTA SEÑALES, LLAMA INMEDIATAMENTE AL 911

Si los riesgos de inyectarse no son suficientes para detenerTe :

- Nunca esté solx cuando te inyectas.
- Ten compañía capaz de reconocer las señales de una infección durante al menos 24 horas.
- Asegúrate de que las agujas estén limpias y nuevas sacadas del paquete. Asegúrate de que la sustancia no se obtiene de un contenedor grande que se usa una y otra vez y que la aguja no se regresa al contenedor que otrxs usaron. (VIH, Hep B y C pueden haberse filtrado al contenedor y luego a tí, o traspasado de la aguja al contenedor.)
- Esteriliza al área primero.
- Haz preguntas sobre lo que se te inyecta de manera que si se presenta algún problema puedas darle la mayor información posible a lxs médicxs.
- **Si experimentas algún problema, llama inmediatamente al 911.** Sé honestx con el personal médico y paramédico cuando lleguen.